

認識大腸癌



建佑醫院 護理部 衛教小組
關心您的健康

※危險因子：

- 1.大於 50 歲的人。
- 2.攝取過量動物來源的食物，如含高脂肪類的食物。
- 3.活動量少者。
- 4.有大腸息肉病史者或是父母、兄弟姐妹被發現有息肉群症者(息肉數在 100 個以上)，其中若患有腺性息肉者更易罹患大腸癌。



- 5.若患有潰爛性結腸炎長達 8 年以上者易罹患大腸癌。

- 6.有腺癌(如肺、腸、胃、甲狀腺、乳癌)之家族史者，此類患者較正常人有兩倍以上的機會得到大腸癌。

※可能會有什麼症狀？

貧血、腹部腫塊及淋巴腺腫大、腹痛、大便習慣改變(如腹瀉、便秘或不規則)、肛門出血、及血便。




※侵犯程度：

第一期：只侵犯腸壁，五年存活率約為 90%。

第二期：侵犯到腸壁周圍組織，五年存活率約為 70%。

第三期：侵犯到附近淋巴腺，五年存活率約為 50%。

第四期：侵犯到遠處器官如肝、肺等，五年存活率約為 5%。



※大腸癌之治療：

1.大腸手術切除：通常是將大腸癌之部位切除後再將好的腸子連接起來，有時腸造口手術是必須的。



2.放射線治療：在大腸癌之治療上此方法是一種輔助性療法，可用來減緩病情的嚴重度，但無法治癒大腸癌。

3.化學治療：全身性的化學治療可有效的殺死癌細胞並延長患者之存活率。

※評估大腸癌之方法：

- 1.詳細的身體檢查
- 2.大便潛血試驗
- 3.大腸鏡檢查
- 4.切片檢查
- 5.血球及血液生物化學之檢查
- 6.腫瘤標記（血液胚胎性癌抗原）之檢查
- 7.電腦斷層之檢查。



諮詢電話：07-6437901 轉 450 衛教小組

衛教組 951018 修訂