

# 建佑 藥訊

主編：建佑醫院藥劑科  
地址：高雄市林園區東  
林西路 360 號  
<http://www.chien-yu.com.tw>

CHIEN-YU HOSPITAL 追求卓越·永續經營

關懷·希望·創新·賦權·專業 *Care·Hope·Innovation·Empower·Profession*

## 本·期·內·容

1. Fluoroquinolone 類抗生素藥品可能造成永久性的神經損傷之風險.....0.....1
2. 本院口服降血糖藥物分類.....2
3. 藥品異動-本院最新藥品異動資訊.....3
4. 新藥介紹-Jandiance 恩排糖.....4

### 用藥安全簡訊

~全國藥物不良反應中心公告~

#### Fluoroquinolone 類抗生素藥品可能造成永久性的神經損傷之風險

美國FDA 發布加註fluoroquinolone 類抗生素(levofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, gemifloxacin)藥品仿單應加註有關嚴重。周邊神經損傷風險之相關內容，包含：嚴重神經損傷之風險可能發生於使用fluoroquinolones 不久後，且可能會造成永久性的傷害。而該風險僅發生於fluoroquinolone 類抗生素之口服或注射劑型，局部外用劑型(眼用、耳用)則尚未知與此風險是否有關。

## 本院口服降血糖藥物分類

林美吟藥師

<b>Sulfonylureas (磺醯尿素類)：</b> 幫助胰臟製造更多的胰島素，增加身體的胰島素利用率。		
	(Euglucon)Gliben 5mg	固利康錠
	(MINIDIAB)Glipizide 5mg/tab	泌得贊錠 5 毫克
	Glimepine(Amaryl) 2mg/tab	胰美平錠
	Diamin-MR 30mg/tab	代蜜持續性藥效錠 30 毫克
<b>Biguanides(雙胍類)：</b> 可藉由抑制肝臟製造過多的葡萄糖降低血糖。		
	Metfopin F.C 500mg/tab	美獲平膜衣錠
<b>A-GLUCOSIDASE INHIBITORS (A-葡萄糖苷酶抑制劑)：</b> 能抑制酵素，阻斷您所攝取的澱粉消化。		
	Acarbose F.C. Tablets 50mg	志樂恆膜衣錠 50 毫克
<b>Thiazolidinediones(胰島素增敏劑)：</b> 提升體內細胞的胰島素敏感性。		
	Glitis 30mg/tab	泌特穩錠 30 毫克
<b>Meglitinides：</b> 幫助胰臟在飯後製造更多的胰島素，因而降低血糖。		
	(NovoNorm)Repaglinide 1mg/tab	柔醣錠
<b>DPP-4 enzyme inhibitors(DPP-4 酵素抑制劑)：</b> 提高腸泌素的活性，間接促進胰島素分泌。		
	Galvus 50mg/tab	高糖優適
	Onglyza 5mg/tab	昂格莎膜衣錠 5 毫克
	Trajenta 5mg	糖漸平膜衣錠 5 毫克
<b>複方降血糖藥</b>		
	Actosmet(15+850)mg/tab	愛妥蜜 15/850 毫克錠劑
	Kombiglyze XR(5+1000mg)	康併莎持續性藥效膜衣錠 5 毫克/1000 毫克
	Trajenta Duo 2.5mg/850mg	糖倍平膜衣錠 2.5/850 毫克
<b>SGLT2 抑制劑</b>		
	Forxiga 10mg/tab	
	Jardiance 10mg/tab	

## 藥品異動訊息

### ※停產停用藥品

<p>代碼：OALUZ          藥名：Aluzaine 10mg          適應症：急,慢性胃炎引起之胃痛,          噁心,胃灼熱以及胃部不快感。          廠商：生達。  <b>【已鎖檔，建議改用其他替代藥】</b></p>	
<p>代碼：OCAS          藥名：Castor-Oil 450cc/bot          適應症：瀉劑。          廠商：應元化學。  <b>【藥局庫存用完鎖檔】</b></p>	
<p>代碼：EACZ          藥名：ACZO 5%          適應症：尋常性痤瘡。          廠商：杏輝  <b>【藥局庫存用完鎖檔】</b></p>	
<p>代碼：EE          藥名：Epidrem 5g          適應症：          溼疹、過敏性及發炎性皮膚炎。          廠商：杏輝  <b>【藥局庫存用完鎖檔】</b></p>	
<p>代碼：SAA          藥名：Alcos-Anal          適應症：痔瘡。          廠商：明德製藥  <b>【藥局庫存用完鎖檔】</b></p>	

## 新藥介紹

### Jandiance 恩排糖

#### 【前言】

第二型糖尿病患者由於胰島素分泌不足或身體無法有效利用葡萄糖等因素，導致體內血糖濃度過高，糖份是身體活動的能量來源之一，但每天都會有約 180 克的糖份經腎臟過濾至尿液中，腎臟中有一種 SGLT2 的蛋白質，可將尿液中的糖份再吸收回體內，避免糖份流失，之前糖尿病的藥物大多著重於補充胰島素及改善身體組織對胰島素的敏感度，現在則多了新一類藥物，稱為 SGLT2 抑制劑，可藉由增加腎臟排除糖份的功能，降低血糖濃度，以下介紹相關 Forxiga 資訊。

#### 【作用機轉】

在近端腎小管表現的鈉-葡萄糖共同轉運蛋白2(SGLT2)，負責從人類腎小管腔再吸收大部分被過濾的葡萄糖。Dapagliflozin是SGLT2的抑制劑。經由抑制SGLT2 減少被過濾的葡萄糖再吸收，和減低腎葡萄糖閾值，因此增加葡萄糖經由尿液排泄。

#### 【成分劑量】

Dapagliflozin 10mg

#### 【適應症】

用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，JARDIANCE 可降低心血管原因死亡的風險。第二型糖尿病。

#### 【使用限制】

JARDIANCE 不建議用於第一型糖尿病病人或用於治療糖尿病酮酸中毒。

#### 【用法與用量】

JARDIANCE可單獨使用亦可與metformin、metformin併用sulfonylurea、pioglitazone(併用或不併用metformin)、胰島素(併用或不併用metformin及/或sulfonylurea)合併使用，作為附加於飲食控制及運動之外的治療藥物，藉以改善第二型糖尿病患的血糖控制效果。

JARDIANCE的建議劑量為每日早上一次、每次10 mg，可與食物一起服用，亦可空腹服用。當耐受性良好，劑量可提升至25 mg。

#### 【交互作用】

SGLT2 抑制劑會促進葡萄糖由尿液排泄，而造成尿糖檢測試驗結果呈陽性。不建議服用SGLT2 抑制劑的病患以尿糖檢測試驗做為監測血糖控制的方法，應使用其他方式監測血糖控制情形。

#### 【不良反應】

低血壓、酮酸中毒、急性腎臟損傷及腎功能不全、尿路敗血症與腎盂腎炎、併用胰島素與胰島素促泌劑時發生的低血糖、生殖器黴菌感染、低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 上升。

#### 【懷孕等級】

懷孕用藥安全屬於 C 級

#### 【禁忌】

1. 對JARDIANCE嚴重過敏反應病史。
2. 嚴重腎功能不全、末期腎病 (ESRD)、或透析患者

參考資料：仿單