

# 建佑 藥訊

主編：建佑醫院藥劑科  
地址：高雄市林園區東  
林西路 360 號  
<http://www.chien-yu.com.tw>

CHIEN-YU HOSPITAL 追求卓越·永續經營

關懷·希望·創新·賦權·專業 *Care·Hope·Innovation·Empower·Profession*

## 本·期·內·容

1. Clarithromycin 成分藥品安全資訊.....1
2. 新一代口服降血糖藥常見的副作用.....2
3. 藥品異動-本院最新藥品異動資訊.....3
4. 新藥介紹-Fucidin 服即淨錠.....4

## 用藥安全簡訊

~全國藥物不良反應中心公告~

### Clarithromycin 成分藥品安全資訊

食品藥物管理署再次提醒合併使用 clarithromycin 和 domperidone 可能會因藥物交互作用導致 QT 區間延長引起致命性心律不整。

1. 使用含 clarithromycin 成分藥品可能會延長心臟再極化和 QT 區間，造成心律不整和 torsades de pointes（多型性心室心律不整）的風險；另 clarithromycin 為強力肝臟酵素 CYP3A4 抑制劑，當與其他主要經由 CYP3A4 代謝的藥物併用時，可能導致這些併用藥物的濃度升高而增加或延長藥物的治療效果以及不良反應。
2. Domperidone 為周邊多巴胺受體拮抗劑，用於治療嘔吐、消化不良及胃輕癱，其主要代謝酵素為 CYP3A4。研究顯示，domperidone 可能延長 QT 區間且與嚴重心室心律不整或突發性心因性死亡風險的增加有關。
3. Clarithromycin 與 domperidone 併用會增加 domperidone 之血中濃度，且因兩者皆會導致 QT 區間延長，併用時可能會引起致命性 心律不整，故不可同時使用。

醫療人員應注意事項：

併用含 clarithromycin 及 domperidone 成分藥品為禁忌，處方時應特別留意兩者不得併用。

## 新一代口服降血糖藥常見的副作用

林美吟 藥師

DPP-4 酵素抑制劑：提高腸泌素的活性，間接促進胰島素分泌。	
Galvus 50mg/tab	皮疹
Onglyza 5mg/tab	關節疼痛
Trajenta 5mg/tab	頭痛
Kombiglyze XR(5/1000mg)複方	腸胃不適
Trajenta Duo(2.5/850mg)複方	鼻咽炎/上呼吸道感染 胰臟炎
SGLT2 抑制劑：抑制葡萄糖在近端腎小管的再吸收，使糖份隨著尿液排出身體。	
Forxiga 10mg/tab	低血壓
Jardiance 25mg/tab	頻尿
Jardiance Duo(10/850mg)複方	腎功能不全
Xigduo XR(10/1000mg)複方	生殖器黴菌感染/泌尿道感染 有活動性膀胱癌的病人不應使用 低密度脂蛋白膽固醇上升

## 藥品異動訊息

新藥：

代碼	品名	適應症
<b>OURIE8</b>	Urief F.C. Tablets 8mg	前列腺肥大症所伴隨的排尿障礙
<b>ODESM</b>	pms-Desmopressin Tablets 0.1mg	中樞尿崩症，原發性夜尿症（限用於6歲以上病患），成人因夜間多尿所導致之夜尿症。
<b>OGLY</b>	Glyxambi Film-Coated Tablets 25/5mg	用於配合飲食控制及運動，以改善下列第二型糖尿病人者的血糖控制：使用metformin 合併 empagliflozin 或 linagliptin 未能達到適當血糖控制者；或已在服用 empagliflozin 及 linagliptin 合併治療者。
<b>OFUC</b>	Fucidin 250mg/tab	革蘭氏陽性菌及葡萄球菌引起之感染症
<b>OLIN</b>	Lindacin 150ng/cap	鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌等所引起之感染症

換廠公告：

1. 原生達 Stawei 更換 衛采 Strocain(5+244)mg/tab 新代碼 **OSTR**
2. 原倍斯特 Plestar 100mg 更換為 永信 Pleya 100mg/tab 新代碼 **OPLEY**
3. 原福盛 OROS Nifedipine 30mg/tab 更換為中化 Nifedipine S.R.F.C. 30mg/tab 代碼不變
4. 原 SANICO Calmday 5mg/tab 更換為 十全 Nargin F.C 5mg/tab 代碼 **ONARG**
5. 原 興采 Sennoside 12mg/tab 更換為中美 Through(Sennoside)12mg/tab 代碼 **OTHRO**
6. 原中生生技 0.5mg Ripam(Rivotril)更換為景德 0.5mg Clonopam 代碼 **OCL00.5**

## 新藥介紹

### Fucidin 服即淨錠

林美吟藥師

#### 【作用機轉】

Fusidic acid 是細菌蛋白質合成抑制劑已產生抗菌效果之作用方式的一種抗生素。Fusidic acid 對部分的革蘭氏陽性菌具有強效的作用，葡萄球菌包括對盤尼希林、二甲氧基苯青黴素及其他對抗生素有抗性的菌種對於 fusidic acid 特別具感受性。臨床經驗證明 fusidic acid 對其他抗生素無交叉抗藥性。

#### 【成分劑量】

Fusidic acid 250mg

#### 【適應症】

革蘭氏陽性菌及葡萄球菌。

#### 【用法與用量】

成人與超過 12 歲之兒童：每日三次，每次二錠。皮膚與軟組織感染：建議劑量為每日二次，每次一錠，症狀嚴重者，劑量可以加倍。依據 Fucidin® 的代謝及排泄，對於腎功能受損或正在接受血液透析病人(由於 Fucidin® 並無顯著地透析效果)不須調整劑量。

#### 【交互作用】

曾有案例發現 Fucidin® 對於 coumarin derivatives 或有類似作用機轉之抗凝血劑會產生抗凝血的作用。為維持所須之抗凝血效果，調整口服抗凝血劑的劑量是必要的。以 CYP-3A4 生物轉化藥物治療之病人應避免使用 Fucidin®。Fucidin® 與 HMG-CoA 還原酵素抑制劑如 statins 系藥物併用會增加血漿中藥物濃度，導致肌酸催化酶的增加生

成 rhabdomyolysis，肌肉無力及疼痛。因此與 statin 類藥物合併用藥是禁忌的。Fucidin® 與 HIV 蛋白質酵素如 ritonavir 及 saquinavir 併用會增加血漿中藥物濃度，造成肝毒性。Fucidin® 與 cyclosporin 併用會增加 cyclosporin 於血漿中濃度。

#### 【不良反應】

胃腸道不適，可逆性黃疸。

#### 【懷孕等級】

懷孕用藥安全屬於 D 級

#### 【禁忌】

妊娠期最後三個月應避免服用，對哺乳婦並無使用上的禁忌。

#### 【注意事項】

1. 由肝臟代謝，因此膽道異常者或併用其他類似排泄途徑之抗生素如 Lincomycin 或 rifampicin 之患者，應定期檢查肝功能。
2. 患有黃疸酸中毒或嚴重急病的新生兒在服用本品時應留意。

參考資料：仿單