



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

# Allopurinol (Allopurinol<sup>®</sup>)

安樂普諾錠

## 用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: [pharmacy0115@gmail.com](mailto:pharmacy0115@gmail.com)

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



## 為什麼我要使用這個藥？

“安樂普諾”錠是降尿酸藥，可用於痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。

## 我應該如何使用這個藥？


1. 請遵照醫師指示使用，固定時間服用，不可隨意改變服用劑量或任意停藥。
2. 建議在飯後服用，以減輕胃腸道刺激。
3. 服藥期間建議每日至少 10~12 杯水份(約 2.5~3 公升)的補充。

## 假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快補服，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

## 服藥期間我要注意什麼？

1. 請限制且少吃含高嘌呤之食物，例如牡蠣、沙丁魚、動物肝臟或腦、腰只、肉湯及飲酒。
2. 黃豆及其製品（豆腐、豆干、豆漿、味增、醬油、



豆芽等)，雖含較高量的普林，但因普林的種類與肉類不同，故仍可適量攝取。

3. 不宜飲用過量的果汁，或服用維他命 C 製劑，可能會增加腎結石生成之潛在性，故需特別小心。
4. 孕婦用藥等級 C，若妳已懷孕或打算要懷孕或正在哺乳的婦女，就診時請務必告知醫師。

## 可能引起的副作用有哪些？

1. 可能有昏昏欲睡、頭痛、噁心、嘔吐或腹瀉，皮膚發疹、發癢等不良反應。
2. 如有皮疹發生或如在皮疹發生的同時，或稍後有流行性感冒樣的症狀（顫慄、發燒、肌痛或噁心或嘔吐）發生時，立即通知醫師，這些症狀可能是嚴重過敏反應的開始。

## 我要如何保存藥品？

避免光照與濕熱，遠離兒童接觸得到的地方，室溫儲存。

