



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

Amoxicillin+clavulanic acid (Augmentin[®])

安滅菌糖漿用粉劑

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: pharmacy0115@gmail.com


建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？

治療細菌感染的抗生素。

我應該如何使用這個藥？


1. 輕拍藥瓶使瓶內粉末鬆散。
2. 慢慢加入半量冷開水將藥粉溶解搖勻，最終加水至瓶身箭頭處。
3. 每次使用前請先搖晃均勻再使用。
4. 請遵照醫師指示，於正確時間服藥，不可隨便停藥或更改劑量

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快補服，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

服藥期間我要注意什麼？

1. 請遵照醫師指示於正確時間服藥，不可隨便停藥或更改劑量。
2. 不要將你服用的藥品給你的家人或朋友服用。



可能引起的副作用有哪些？

腸胃道不適(可與食物併服來緩解症狀)、腹瀉或過敏。

我要如何保存藥品？

1. 未開封藥品：請存放室溫。
2. 泡製好的藥水應放置於冰箱冷藏儲藏，可放7天。

