建佑醫院
CHIEN-YU HOSPITAL

Carbamazepine (Carpine®)

卡賓錠

用藥指導單

本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150
e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全

為什麼我要使用這個藥？

主要用於控制癲癇、痙攣、三叉神經痛及治療周邊神經病變引起的疼痛。

我應該如何使用這個藥？

請遵照醫師指示使用，固定時間服用，非經醫師指示，請勿擅自改變服用劑量或任意停藥，以避免痙攣或癲癇發作。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快補服，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

服藥期間我要注意什麼？

1. 服藥期間可能會讓您覺得頭暈、動作不協調、視線模糊、複視、睏倦，請勿開車或操作危險機械等須高度警戒之工作，如從事具潛在危險之活動應有人陪同。
2. 服藥期間應定期檢測肝功能、血液及眼睛檢查。
3. 懷孕婦女不建議使用；不建議於授乳期間使用本

品，最好能改用其它的乳製品以取代母乳。

可能引起的副作用有哪些？

1. 可能有頭暈、視覺模精、嗜睡、疲倦、意識模糊、頭痛、運動協調不良反應。
2. 本藥品有可能發生罕見但嚴重的皮膚過敏反應，服藥期間如出現喉嚨痛、嘴破、眼睛癢、皮膚紅疹，應立即停藥回診。

我要如何保存藥品？

避免光照與濕熱，遠離兒童接觸得到的地方，室溫儲存。