



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

Oleum ricini (Castor oil[®])

蓖麻子油

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？

本品可增加腸蠕動產生緩瀉作用，緩解便秘或欲進行手術/檢查前淨腸。

我應該如何使用這個藥？


1. 請遵照醫師指示使用，固定時間服用。
2. 服藥之後請喝大量開水（2000 毫升以上）以助淨腸。
3. 若口感不佳，可併服開水、運動飲料、茶等。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快補服，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

服藥期間我要注意什麼？

1. 過度使用瀉劑或攝取水分不當，可能引起水及電解質失調，要定期監測。
2. 長期使用刺激性瀉劑可能造成對藥物的依賴。
3. 會增加病患如廁頻率，故在如廁時應慎防跌倒。



可能引起的副作用有哪些？

1. 服藥後可能有腸道過度活動情形，如腹絞痛、腹痛、噁心、嘔吐等。
2. 若上述症狀持續且有嚴重趨勢或有過敏反應，如虛弱、暈眩、心悸、劇烈絞痛、血便或肛門出血等，請立即停藥並就醫。

我要如何保存藥品？

避免光照與濕熱，遠離兒童接觸得到的地方，室溫儲存。

