



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

Calcium Polystyrene Sulfonate (Chalian[®])

鉀利安粉

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？

鉀利安[®]粉是一種用來治療高血鉀症。

我應該如何使用這個藥？

1. 請遵照醫師指示使用，固定時間服用。
2. 每次量以開水 30-50ml 混合後服用。



+




30-50ml 開水

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快補服，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

服藥期間我要注意什麼？

1. 易便秘、腸管狹窄者，應審慎使用。
2. 若發生便秘，且伴隨持續腹痛、嘔吐症狀，請儘快與你的處方醫師聯絡。



可能引起的副作用有哪些？

下次回診時主動告知醫師	請立即就醫，做一步的處置
便秘、食慾不振、噁心。	重度便秘，且伴隨持續腹痛、嘔吐症狀。

我要如何保存藥品？

避免光照與濕熱，遠離兒童接觸得到的地方，室溫 25°C 以下儲存。

