



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

# Fentanyl<sup>®</sup> transdermal patch

吩坦尼穿皮貼片

## 用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: [pharmacy0115@gmail.com](mailto:pharmacy0115@gmail.com)

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全




## 為什麼我要使用這個藥？

吩坦尼穿皮貼片劑用來解除癌症及其他疾病引起的疼痛。

## 我應該如何使用這個藥？

1. 請確實遵照醫師指示使用藥品，切勿自行加減藥量。
2. 依醫師指示貼在適當位置，前胸、後背、上半臂、大腿等平坦處（不需要痛哪裡貼哪裡）。
3. 請避開傷口和放射線治療部位，使用部位先以清水清潔，待完全乾燥後才可貼上。
4. 若無法避免有體毛的部位，請以剪刀作修剪（不可用刮或剃的方式修剪）。
5. 以手掌緊壓30秒，以確保貼片及四周完全緊貼。（如會脫落可用透氣膠帶貼於左右邊加強）。
6. 每3天換片一次（依醫師指示），請每次換貼不同部位。



## 假如我忘記服藥應該怎麼辦？


想起時儘快使用，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

## 服藥期間我要注意什麼？

1. 不可將貼片裁剪。
2. 避免泡熱水澡，或將貼片直接接觸熱源（熱水袋、電毯）。
3. 第一次使用不可馬上停用原止痛藥（請依指示慢慢停藥）。
4. 請務必填寫紀錄表（貼上及撕下的日期時間，並簽名），請將撕下的貼片對折放入回收袋，紀錄表於回診時由醫師簽章，並於領藥時繳回紀錄表及貼片。

## 可能引起的副作用有哪些？

偶有噁心、嘔吐、心跳異常、皮膚過敏、視力模糊、暈眩等的副作用，可以告知醫師調整藥物來減少副作用。



## 我要如何保存藥品？

避免光照與濕熱，遠離兒童接觸得到的地方，室溫儲存。

