



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

# 定量噴霧劑(MDI) 使用方法

## 用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: [pharmacy0115@gmail.com](mailto:pharmacy0115@gmail.com)


建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全




# 我應該如何使用這個藥？

## 一、配合吸入輔助器的使用方法：

	1. 將吸入輔助器與噴霧液罐含口器接合。
	2. 將蓋子與吸入輔助器一邊連接。
	3. 上下搖動噴霧液罐，同時確定連接處確定連接處是否緊密。
	4. 以食指按壓底部，次數請依醫師指示，並確認有藥物在輔助器內。
	5. 吐氣到底後閉氣，然後除去護蓋。
	6. 立刻以正常呼吸速度，從吸入輔助器之一端吸入，閉氣至少5~10秒。




## 二、無吸入輔助器的使用方法：

	1. 移去蓋子，將噴霧劑充分振搖。
	2. 手持噴霧劑，緩緩吐氣到底。
	3. 壓一下，手口配合。
	4. 含緊吸嘴，慢且深的吸入到飽。 (約 3-4 秒) 5. 閉氣至少 5-10 秒。

### 服藥期間我要注意什麼？

1. 儲存溫度勿超過 $50^{\circ}\text{C}$ ，不要放在車上以免過熱。
2. 瓶內有壓力，使用完的空瓶也不可戳破、燃燒。
3. 若你使用之定量噴霧劑含有類固醇成分，請在每次給藥後以水漱口，以減少口腔咽喉發生念珠菌感染之機率。



## 我要如何保存藥品？

請將本劑連同藥袋放置於在室溫的陰涼乾燥處，請勿放在孩童可以取得的場所。

## 我要如何判斷定量噴霧劑剩餘量？

