



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

Nicotine TTS (Nicotinell 貼片[®])

克菸貼片

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？

本品用於幫助戒菸。

我應該如何使用這個藥？


1. 請確實遵照醫師指示使用藥品，切勿自行加減藥量。
2. 移去貼片外層的護套，將此貼片貼於清潔、乾燥、完整的皮膚上（不能有乳液、酒精、軟膏殘留物，建議貼於軀幹、上臂、臀部），並用手掌輕壓 10 秒鐘。
3. 每日使用一片，並在皮膚上停留 24 小時。
4. 為預防局部刺激現象，每天應使用於不同部位。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快使用，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

用藥期間我要注意什麼？

1. 使用戒菸貼片治療時，必須完全停止吸煙。使用本貼片時繼續抽煙所產生的副作用，包括心血管作



用，會較吸煙時大。

可能引起的副作用有哪些？

下次回診時主動告知醫師	請立即就醫，做一步的處置
頭痛、睡眠障礙、注意力不集中、異常夢多、疲倦、口乾、食慾增加、消化不良、腹脹、吞嚥困難。	心跳增加、血壓改變、蒼白、出汗、噁心、流涎、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、暈眩、聽覺和視覺受損、震顫、精神混亂、肌肉無力、抽搐、虛脫、缺乏精神學反應、呼吸衰竭、消化性潰瘍、過敏症狀。

我要如何保存藥品？

1. 避免光照與濕熱，遠離兒童接觸得到的地方，室溫儲存。
2. 貼片使用後仍含有尼古丁成分，應包裹完全後再丟棄，避免被兒童觸及。

