



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

# Nitroglycerin (Nitrostat<sup>®</sup>)

耐絞寧舌下錠

## 用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: [pharmacy0115@gmail.com](mailto:pharmacy0115@gmail.com)

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



## 為什麼我要使用這個藥？


耐絞寧舌下錠<sup>®</sup>是血管擴張劑，可改善心臟的血流與氧氣的供應，用來治療或預防心絞痛，緩解胸痛。

## 我應該如何使用這個藥？

1. 請遵照醫師指示使用。
2. 不可吞服，只能口腔或舌下使用，最好在坐下時使用，以避免因頭暈而跌倒。
3. 當急性心絞痛發作時，迅速將一粒耐絞寧舌下錠<sup>®</sup>置於舌下使其溶化吸收。
4. 在症狀緩解前，每隔五分鐘重複服用一粒。以此方法，若在十五分鐘內服用 3 粒後，仍舊無法解除心絞痛，請迅速就醫。

## 服藥期間我要注意什麼？

1. 請戒煙、減重、休息以及避免從事引起心絞痛的活動。
2. 請記得隨時準備充分藥量，且外出時要隨身攜帶。
3. 耐絞寧舌下錠<sup>®</sup>置於舌下時可能會有燒灼或刺痛感，但此種感覺並不能用來作為判定藥品是否有效



的可靠依據。

4. 服用該類藥物期間，請勿飲酒及服用 Sildenafil（威而剛），可能會導致嚴重低血壓、眩暈、暈厥或心血管併發症。
5. 請隨時注意藥品的有效期限。

## 可能引起的副作用有哪些？

可能會暈眩、頭重腳輕、虛弱、心跳加快、胃不舒服、臉潮紅等症狀，如會影響您的生活品質時，門診時請告訴醫師。

## 我要如何保存藥品？

1. 請以原有的玻璃容器保存藥品，取用後請儘速栓緊瓶蓋，於室溫下(25°C)保存。
2. 避免潮濕或貼身存放。

