



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

# Diocahedral Smectite (Smecta<sup>®</sup>)

“舒腹達” 口服懸液用粉劑

## 用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: [pharmacy0115@gmail.com](mailto:pharmacy0115@gmail.com)

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？  
主要用於急性和慢性腹瀉。

我應該如何使用這個藥？

1. 請遵照醫師指示使用，固定時間服用。
2. 每包以 50ml 水混勻或與半流質如：肉湯、果汁、菜泥、嬰兒食品混勻後服用。



+




50ml 開水

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快補服，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

服藥期間我要注意什麼？

1. 本品的吸附作用可能干擾其他藥物的吸收與排



除，應盡量避免與其他藥品同時使用，如需服用其他藥物，建議與舒腹達間隔一段時間。

2. 舒腹達並非補液治療，所以舒腹達不能替代補液療法，脫水病例應適當補充液體。

### 可能引起的副作用有哪些？

可能有極少數病例出現便秘，減少劑量後，可繼續進行治療。

### 我要如何保存藥品？

請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿放在孩童可以取得的場所。

