



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

乾粉吸入劑(Turbuhaler) 使用方法

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150


e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



我應該如何使用這個藥？

	<p>1. 開</p>	<p>1. 旋轉並移開瓶蓋</p>
	<p>2. 轉</p>	<p>2. 旋轉底部 先向右轉到底後，再向左轉到底，聽到“喀喀”一聲，即為完成一次吸入劑量之充填。</p>
	<p>3. 吸 4. 閉</p>	<p>3. 緩緩吐氣到底，然後含緊吸嘴，用力、快速且深吸一口氣。 4. 將吸入劑從嘴唇移開，並閉氣約5~10秒鐘。然後緩慢吐氣，恢復正常呼吸。</p>
	<p>5. 關 (漱)</p>	<p>5. 關上瓶蓋且旋緊(並請漱口)。</p>




假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快使用，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

服藥期間我要注意什麼？

1. 請勿對吸嘴呼氣。
2. 每一次投與的劑量相當微量，吸入後幾乎沒有味道及感覺，若您使用正確即可吸入足夠治療劑量，若非醫師指示切勿再使用一次。
3. 定期(每週)清潔吸嘴:用乾布將吸嘴內的藥粉擦拭乾淨。絕對不可用水清洗。
4. 當您搖晃吸入劑時，所聽到的聲音為乾燥劑非藥物所產生。
5. 若你使用之乾粉吸入劑含有類固醇成分，請在每次給藥後以水漱口，以減少口腔咽喉發生念珠菌感染之機率。



我要如何保存藥品？

請將本劑連同藥袋放置於在室溫的陰涼乾燥處，請勿放在孩童可以取得的場所。

我要如何判斷乾粉吸入劑剩餘量？

當指示窗第一格出現紅色標示區，表示還有 20 次劑量(如下圖)，當紅色標示區轉到指示窗下緣，表示都保吸入瓶內的藥已用完。

