



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

Azithromycin (Zithromax[®])

日舒懸液用粉

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？

治療細菌感染的抗生素。

我應該如何使用這個藥？


1. 輕拍藥瓶使瓶內粉末鬆散。
2. 以藥盒內附 5ml 的針筒加入 9ml 冷開水。
3. 立即搖動以溶解藥粉，可泡製成 15ml 的藥水。
4. 泡製後，每次使用前請先搖勻，再倒出所需服用之藥量。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快補服，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

服藥期間我要注意什麼？

1. 請遵照醫師指示於正確時間服藥，不可隨便停藥或更改劑量。



可能引起的副作用有哪些？

腸胃道不適(可與食物併服來緩解症狀)、腹瀉或過敏。

我要如何保存藥品？

1. 未開封藥品：請存放30°C以下。
2. 已經泡製好的藥品：請蓋緊瓶蓋，儲存於室溫，可保存10天。

