

處方集內文異動一覽表

異動日期	原文	異動內容	異動型式
1030528	【商品名】 Nifedipine® retared 20mg/tab	【商品名】 Nifepine® SR 20mg/tab	修改
1030606	【商品名】 Lyo-Vancin® 500mg/vial 代碼：ILVAN	【商品名】 Vancomycin® 500mg/vial 代碼：IVAN	修改
1030603		<p>●Nicardipine 【C】</p> <p>【商品名】 Perdipine® 10mg/10ml/amp 代碼：IPERD</p> <p>【劑 量】 手術時異常高血壓的緊急處理 IVD, initial 2-10 μ g/kg/min. 高血壓性緊急症 IVD, initial 0.5-6 μ g/kg/min.; max: 15mg/hr</p> <p>【適應症】 適用於當口服治療不可行或不合適時、對高血壓的短期處置。</p> <p>【副作用】 Headache, peripheral edema, flushing.</p> <p>【禁 忌】 有肝腎功能障礙者、大動脈瓣狹窄症。</p> <p>【注 意】 本品應以0.9%N/S或5%G/W稀釋。</p>	新增
1030701		<p>●Exenatide 【C】</p> <p>【商品名】 Bydureon ® (GLP-1) 2mg/syr. 代碼：IBYD</p> <p>【劑 量】 SC: 建議劑量為每七天(每週)投予注射一次。</p> <p>【適應症】 Type 2 DM</p> <p>【副作用】 噁心、嘔吐、頭痛、消化不良、腹瀉、注射部位紅腫、蕁麻疹。</p> <p>【禁 忌】 甲狀腺髓質癌及對exenatide過敏者。</p> <p>【注 意】 1.不可用於第一型糖尿病病患。 2.尚未研究Bydureon與胰島素併用，因此不建議其合併使用。 3.若忘記注射一次劑量，且下一劑注射時間為一至三天後，則不建議補打。</p>	新增
1030701	【商品名】 Alfasuly® (Onealfa)	【商品名】 Alfalcidol® (Onealfa)	修改
1030709	【商品名】 Sennoside® 12mg/tab 代碼：OSEN	【商品名】 Through® 12mg/tab 代碼： OTHRO	修改
1030709	<p>●Combeplex® (Vit B-Complex) 代碼：IB</p> <p>【成 分】 Thiamine 100mg+ Riboflavin 5mg+ Pyridoxine 5mg+ Nicotinamide 50mg+ Sodium Pantothenate 5mg+ Benzyl Alcohol 20mg/ml</p>	<p>●B-Complex ® 代碼：IB</p> <p>【成 分】 Thiamine 100mg+ Riboflavin 5mg+ Pyridoxine 5mg+ Nicotinamide 50mg+ Sodium Pantothenate 5mg+ Benzyl Alcohol 20mg/ml</p>	修改
1030814	【商品名】 Benzor® 100mg/cap	【商品名】 Benzro® 100mg/cap	修改
1030826	【商品名】 Quinax® oph soln 15ml/bot	【商品名】 Quinax® oph soln 5ml/bot	修改
1030827		<p>●PEG 400+ Propylene Glycol 0.6%</p> <p>【商品名】 Systane®Ultra uni-dose 0.5ml/支 代碼：ESYSU</p> <p>【劑 量】 需要時，每次1-2滴。</p> <p>【適應症】 暫時緩解因眼睛乾澀所引起之灼熱感與刺激感。</p> <p>【注 意】 使用後若有產生眼睛劇痛、視力模糊、或眼睛持續發熱、熱、刺激感，應停藥立即就醫。</p>	新增

異動日期	原文	異動內容	異動型式
1030827	<p>●Tilise-Dextrose®</p> <p>【成分】Thiamine Disulfide 5mg+ Dextrose 200mg/ml, 20ml/amp 代碼：ITIL</p> <p>【劑量】Adult: 5-100mg, slow IV qd or bid</p> <p>【適應症】多發性神經炎、腳氣病及其他維生素B1缺乏症。</p>	<p>●Neo-Vitabose(AF)®</p> <p>【成分】Thiamine Disulfide 100mg+ Dextrose 8g, 20ml/amp 代碼：INVI</p> <p>【劑量】Adult: 10-20ml/day, slow IV.</p> <p>【適應症】腳氣病、多發性神經炎、營養補給、維他命B1缺乏症。</p>	修改
1030827		<p>●Dexlansoprazole 【B】</p> <p>【商品名】Dexilant® Delayed Release 60mg/cap 代碼：ODEXI</p> <p>【劑量】糜爛性逆流性食道炎(EE):60mg qd for 8weeks</p> <p>【適應症】治療糜爛性逆流性食道炎</p> <p>【副作用】腹瀉、腹痛、噁心嘔吐、脹氣、上呼吸道感染。</p> <p>【注意】1.中度肝功能不全（Child-Pugh分級B）的患者，每天最高劑量為30 mg。 2.本品必須整粒吞服，請勿咀嚼。 3.本品用於鼻胃管病人可打開膠囊並將全部的細粒放入裝有20毫升開水的容器後使用。</p>	新增