

處方集內文異動一覽表

異動日期	原文	異動內容(紅色字部分)	處方集 (6th)頁碼	異動型式
1030903	●Infanrix® 0.5ml/vial (五合一疫苗) (IM) 代碼：IIPVH(1劑)/ IIPVH2(2劑)/ IIPVH3(2劑)/ IIPVH4(2劑)	●Infanrix® 0.5ml/vial (五合一疫苗) (IM) 代碼：IIPVH(1劑)/ IIPVH2(2劑)/ IIPVH3(3劑)/ IIPVH4(4劑)	151	修改
1030916		【商品名】 Nifedipine® OROS 30mg/tab 代碼：ONIF 【劑 量】 5.Nifedipine® OROS: 30mg qd; max:120mg/day	42-43	新增
1030919	●Warfarin 【B】 【商品名】 Orfarin® 3mg/tab 代碼：OORF 【劑 量】 Infants and child: 0.05-0.34mg/kg/day Adult: initial 5mg/day for 2-5 days, then 2-10mg/day according to PT or INR 【適應症】 靜脈栓塞症。	●Warfarin 【D/X】 【商品名】 Orfarin® 3mg/tab 代碼：OORF 【劑 量】 Infants and child: 0.05-0.34mg/kg/day Adult: initial 5mg/day for 2-5 days, then 2-10mg/day according to PT or INR 【適應症】 靜脈栓塞症。 【副作用】 Hemorrhage, edema, fever, skin lesions, alopecia, leukopenia, agranulocytosis, hepatotoxicity. 【禁 忌】 1.嚴重肝功能不良的患者。 2.胃腸道潰瘍或顱內出血的患者。 3.孕婦。 【注 意】 1.本品須監測PT及INR。 2.解毒劑: Vit.K1 (initial: 0.5-10mg, if necessary, increased to 25mg) 3.本品應避免食用葡萄柚(汁)。 4.應衛教病人服用期間勿併服酒精性飲料、不 要攝取過多富含維生素K的食物；有計畫拔牙或施行手術，要主 動告知醫師。	90	修改
1030919		●Gardasil (四價人類乳突病毒疫苗) 【B】 【商品名】 Gardasil® 0.5ml/amp (自費) 代碼：IGARD 【劑 量】 IM；接種時間為第0、2及6個月。 【適應症】 9-26 歲女性之預防接種；疫苗所含的人類乳 突病毒四型(第6、11、16 及18 型)所引起 的子宮頸癌、陰道及外陰部癌、生殖器疣(俗 稱菜花)。 【副作用】 注射部位痛、腫脹、癢和發紅、以及輕微發燒。 【注 意】 冷藏於2-8°C、不可冷凍、避光儲存。	...	新增
1030919		●Rota virus, live attenuated (口服輪狀病毒疫苗) 【C】 【商品名】 Rotarix® 0.5ml/amp (自費) 代碼：OROTA(1劑)/OROTA2(2劑) 【劑 量】 最好在出生後六至十六週接種，必須在出生後 二十四週內完成。兩劑間隔不得少於四週。 【適應症】 預防輪狀病毒所引起的腸胃炎。 【注 意】 1.需於2-8°C 冷藏儲存。 2.本品僅供口服使用。	...	新增
1030925	●Salazopyrin 【B】 【商品名】 Sulfasalazine® EN 500mg 代碼：OSAL	●Sulfasalazine 【B】 【商品名】 Salazine® EC 500mg 代碼：OSALA	68	修改
1030925	●Aripiprazole 【C】 【商品名】 Abilify® 15mg/tab 代碼：OABI	●Aripiprazole 【C】 【商品名】 Aripiprazole® 10mg/tab 代碼：OARIP 【劑 量】 急性期治療劑量：10-30mg qd 維持劑量：15mg qd	15	修改