

處方集內文異動一覽表(1031031三修)

異動日期	原文	異動內容(紅色字部分)	處方集(6th) 頁碼	異動型式
1031021		<p>I. Hormones (j)Hyperprolactinemias ●Bromocriptine 【C】 【商品名】Volbro®(Parlodel) 2.5mg/cap 代碼：OVOLB 【劑量】乳漏症、催乳素引起之月經失調及不孕症： 1.25-2.5mg bid-tid 抑制泌乳：1.25-2.5mg bid-tid, max:2.5-15mg 男性機能減退：1.25mg bid-tid, max:5-10mg/day. 催乳素分泌腺瘤：1.25-2.5mg bid-tid, max:2.5-15mg 肢端肥大症：Initial 1.25-2.5mg bid-tid, max:100mg/day 帕金森氏病：2.5-40mg/day, max: 100mg/day 【適應症】乳漏症、催乳素引起之月經失調及不孕症、抑制泌乳、帕金森氏病、男性機能減退、催乳素分泌腺瘤、肢端肥大症 【副作用】可能有噁心、嘔吐、眩暈、低血壓、便秘、思睡情形。 【禁忌】1.對Bromocriptine或其他麥角鹼過敏者。 2.懷孕期、分娩後或產褥期具血壓偏高者。</p>	115	新增
1031021		<p>●Ticagrelor 【C】 【商品名】Brilinta® 90mg/F.C tab 代碼：OBRIL 【劑量】loading dose: 180mg(2 tabs), then 90mg bid. 【適應症】可減少急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率。 【副作用】可能發生呼吸困難、頭痛、咳嗽、頭暈、噁心等症狀。 【禁忌】有顱內出血病史(ICH)、活動性出血、嚴重肝功能不全、對ticagrelor成分過敏者。 【注意】1.與Aspirin併用時，Aspirin之loading dose通常是325 mg，維持劑量為每天75-100 mg。 2.(健規)限用於已發作之急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)而住院的病人時，得與acetylsalicylic acid (如Aspirin) 合併治療，最長9個月。需於病歷註明住院時間。</p>	90	新增
1031021		<p>●Seretide® Accuhaler 【C】 【成分】Salmeterol 50 µg+ Fluticasone 250 µg/dose, 60 doses/bot 代碼：ESER Salmeterol 50 µg+ Fluticasone 500 µg/dose, 60 doses/bot 代碼：ESERA5 【劑量】Adult(> 12 yrs): 1 dose bid 【適應症】(1)可逆性呼吸道阻塞疾病(ROAD)，包含氣喘、嚴重慢性阻塞性肺部疾病。(Seretide® 50/250) (2)成人及12歲以上青少年之嚴重氣喘及中至重度(FEV1<60%)慢性阻塞性肺部疾病之維持性治療。(Seretide® 50/500) 【副作用】Candidiasis infection、tremor、palpitation. 【注意】1.本品須常規使用，不可驟然停藥。 2.不可用於急性氣喘發作。 3.使用後以清水漱口，避免口腔念珠菌感染。</p>	64	修改
1031021		<p>●Xamiol® Gel 【C】 【成分】每g含Calcipotriol 50ug+Betamethasone0.5mg, 30g/bot 代碼：EXAM 【劑量】Topical: qd, 【適應症】治療頭皮、非頭皮部位之輕度至中度尋常性牛皮癬。 【副作用】短暫局部刺激及罕見的顏面皮膚炎。 【禁忌】對本品成分過敏者及鈣代謝失調者禁用。 【注意】(健規)<1bot(30g)/wk，如需使用超過1支，應於病歷詳細記載理由；同一部位療程不得超過4周。</p>	146	新增

異動日期	原文	異動內容(紅色字部分)	處方集 ^(6th) 頁碼	異動型式
1031021	●Acarbose 【B】 【商品名】Glucobay® 50mg/tab 代碼：OACA	●Acarbose 【B】 【商品名】Acarbose® 50mg/tab 代碼：OACA	104	修改
1031022	【商品名】Suzin® 5mg/cap 代碼：OSUZ 【劑量】Adult: 10mg hs or 10mg bid	【商品名】Suzin® 5mg/cap 代碼：OSUZ 【劑量】Adult: 5-10mg once daily 預防偏頭痛：5-10mg qd 預防暈動病：30分鐘前給予10mg 暈眩：20mg tid 末梢血管循環障礙：10-20mg qd	55	修改
1031024		●Mexiletine 【C】 【劑量】Meletin® 100mg/cap 代碼：OMEX 【劑量】loading dose: 400mg; maintenance: 400-800mg/day, divided bid-tid. max: 1200mg/day 【適應症】心室性不整律 【副作用】heartburn, nausea, vomiting. 【禁忌】懷孕、授乳。 【注意】本品為Class Ib Antiarrhythmics.	44	新增
1031024		●Propafenone 【C】 【劑量】Rytmonorm® 100mg/cap 代碼：ORYT 【劑量】Initial and maintenance dose: 150-600mg, divided bid-tid; max: 900mg/day 【適應症】心室性心搏過速、上心室性心搏過速、W-P-W 症候群。 【副作用】GI disturbance, dizziness, bradycardia or tachycardia. 【禁忌】懷孕前三個月與授乳婦女應由醫師審慎評估其效益後決定是否給藥。 【注意】1.本品為Class Ic Antiarrhythmics. 2.發生心搏徐緩或竇房傳導障礙時，可用 atropine或orciprendine來救治。 3.局部麻醉劑或抑制心跳及心肌收縮藥物可增強本品之藥效。	44	新增
1031024	●Pisutam® (Tazocin) 【商品名】Piperacillin 2g+ Tazobactam 250mg/vial 2.25g/vial 代碼：IPIS	●Pipe&Tazo® (Tazocin) 【商品名】(Piperacillin 2g+ Tazobactam 250mg)/vial; 2.25g/vial 代碼：IPITA	121	修改
1031024	●Aluminum hydroxide 【商品名】Dry Aluminum® (Alugel) 324mg/tab 代碼：OALU	●Aluminum hydroxide dried gel 【商品名】Weil® (Alugel) 300mg/tab 代碼：OALU	65	修改