

處方集內文異動一覽表(104五修)

異動日期	原文	異動內容(紅色字部分)	處方集 ^(6th) 頁碼	異動型式
1040126	●Cimetidine 【B】 【商品名】 Stogamet® 200mg/amp 代碼：ISTO Tamedin® 200/tab 代碼：	●Cimetidine 【B】 【商品名】 Cimetidine® 200mg/2ml/amp 代碼：ICIM Tamedin® 200mg/tab 代碼：OTAME	66	修改
1040126	●Tranexamic acid 【B】 【商品名】 Tren® 250mg/cap代碼： OTREN	●Tranexamic acid 【B】 【商品名】 Tranex® 250mg/cap 代碼：OTRA	86	修改
1040126	●Mecobalamine 【A】 【商品名】 Mecomin(CHB12)® 0.5mg/cap代碼：OMEC	●Mecobalamine 【A】 【商品名】 Yipa(Mecomin)® 0.5mg/cap代碼：OYIP	83	修改
1040210	●Protamine sulfate 【商品名】 Protamine® 50mg/5ml/amp 代碼：IPROT 【劑量】 Deep SC: 1-1.5mg protamine per 100IU heparin; max: 50mg given over 10 minutes Slow IV: loading 25-50mg, with the rest of the calculated dose over 8-16 hrs; max: 5ml/time 【適應症】 中和過量的Heparin。 【副作用】 Hypotension, bradycardia, dyspnea, hemorrhage, flushing. 【注意】 1.給藥時要slow IV>10分。 2.10mg protamine可中和1400IU Heparin。	●Protamine sulfate 【C】 【商品名】 Protamine® 50mg/5ml/amp 代碼：IPROT 【劑量】 <u>Heparin overdose: slow IV(1-3 mins)</u> 1-1.5mg protamine per 100IU heparin, ; max: 50mg given over 10 minutes <u>LMWH overdose (off-label use): slow IV</u> (1)Enoxaparin administered in ≤8 hours: 1mg of protamine neutralizes 1mg of enoxaparin. (2)Enoxaparin administered in >8 hours: 0.5mg of protamine neutralizes 1mg of enoxaparin. (3)Dalteparin or tinzaparin: 1mg protamine for each 100 anti-Xa units of dalteparin or tinzaparin. 【適應症】 中和過量的Heparin。 【副作用】 Hypotension, bradycardia, dyspnea, hemorrhage, flushing. 【注意】 1mg protamine約可中和100IU heparin.	87	修改

OK

OK

OK

OK